

Fractura supracondílea e intercondílea de fémur con fragmento supratroclear.


Osteosíntesis basada en la colocación de un tornillo de tracción y dos agujas en aspa.

Caso 4

Tomás Fernández González DVM PhD

CENTRO MEDICO VETERINARIO Delicias

tomasfer@wanadoo.es



Caso 4

Nombre: RON

Especie: Felina


Raza: Común Europeo

Sexo: Macho

Edad: 8'5 meses


Peso: 3Kg

El gato sufre una fractura de fémur supracondílea e intercondílea, al caer desde una altura considerable. Las dos proyecciones nos definen con nitidez las lesiones descritas, pero no permiten visualizar de forma clara la existencia de un fragmento supratroclear que añadirá complejidad a la resolución quirúrgica.



Tratamiento

Tras unir los dos cóndilos mediante un tornillo de 2 mm colocado en modo de tracción, se fija el fragmento suelto supratrocLEAR al área metafisaria con una pequeña aguja de Kirschner de 0'8 mm. A continuación se resuelve la fractura que resta, supracondílea, con la introducción de dos agujas de 1'5 mm en aspa.



Evolución

1º mes.

En las dos proyecciones (antero-posterior y medio-lateral) se aprecian indicios de cicatrización ósea.

El animal anda correctamente.



Fin de la evolución 2 meses y medio.

En las proyecciones antero-posterior y medio-lateral se aprecia una buena cicatrización ósea. El animal sigue andando con normalidad.

Comentarios

Las fracturas distales de fémur en animales jóvenes son frecuentes, y de forma especial en los gatos, al caer desde diferentes alturas. Sin embargo estas epifisiolisis se pueden complicar al convertirse en intercondilares o incluso, como es el caso, fragmentarse aun más la tróclea.