2-YUKI

Gato común europeo, 4 kg, 1 año

Fractura muy distal de cubito-radio

Se plantea si es posible la reconstrucción o tenemos que recurrir a la panartrodesis. Planteamos con el propietario la primera opción, dejando la panartrodesis para una segunda cirugía si la evolución de la primera opción no fuera adecuada.

LEPANTO
REFERENCIA VETERINARIA
TRAUMATOLOGIA
Y CIRUGIA ESPINAL
CENTRO DE
REFERENCIA
EN ENDOSCOPIA

YUKI

POST CIRUGÍA

Ponemos una aguja K de fijación temporal, que finalmente se decide dejar para que aporte algo de estabilidad.
La estabilidad principal la conseguimos con una placa FIXIN en T con tornillos de 1,5 porque es la placa bloqueada más pequeña que existe en el mercado.
La parte distal de la placa se moldea cerrando un poco los orificios y se orientan los tornillos en distinto plano para que no se toque entre si.

LEPANTO
REFERENCIA VETERINARIA
TRAUMATOLOGIA
Y CIRUGIA ESPINAL
CENTRO DE
REFERENCIA
EN ENDOSCOPIA

YUKI

1 MES POST CIRUGÍA



LEPANTO
REFERENCIA VETERINARIA
TRAUMATOLOGIA
Y CIRUGIA ESPINAL
CENTRO DE
REFERENCIA
EN ENDOSCOPIA

YUKI

2 MESES POST CIRUGÍA

La osicafición es correcta en 60 días. Se recomienda al propietario retirar el implante por lo cercano que se encuentra de la linea articular, pero se niega porque el animal está clínicamente perfecto y no quiere someterlo a una nueva intervención





LEPANTO
REFERENCIA VETERINARIA
TRAUMATOLOGIA
Y CIRUGIA ESPINAL
CENTRO DE REFERENCIA
EN ENDOSCOPIA