

# **Infección por *Tritrichomonas foetus* en gatos y su tratamiento con RONIDAZOL**

## **Información para el propietario**

En un estudio reciente de la Dra. Jody Gookin de la Universidad de North Carolina State (autora de la mayoría de los trabajos sobre la infección por *T. foetus* en gatos) describió que el ronidazol (un antibiótico similar pero no igual al metronidazol) tiene eficacia frente a *T. foetus* en gatos (JVIM, 2005 19: 436; JVIM, 2006 20: 536-543). De algunos de los pocos estudios se desprende que su uso es seguro en gatos, aunque un número reducido de pacientes desarrollaron signos neurológicos p.e. tics y convulsiones, que se resolvieron tras la interrupción del tratamiento. (Los signos neurológicos son similares a los observados en algunos gatitos, o gatos con enfermedad hepática, cuando se les administra dosis normales o altas de metronidazol).

**El Ronidazol no tiene licencia para su uso en gatos.**

**Se deben tomar precauciones mientras se trata con ronidazol;** existen muy pocos estudios de su uso en gatos y los que existen de otras especies sugieren la posibilidad de toxicidad (en muchos países su uso en animales de granja se ha prohibido para reducir la exposición de los humanos al fármaco) Así mismo se debe llevar cuidado en la manipulación de las cápsulas.

Nombre del propietario: .....

Nombre de gato: .....

Caso número: .....

Raza: ..... Edad: ..... Género: .....

Yo ..... (Propietario) acabo de leer este documento, entiendo que no existe la licencia para usar Ronidazol en gatos, y que las cápsulas contienen el principio activo puro. Informaré a mi veterinario inmediatamente si el gato/a muestra alguno de los potenciales efectos tóxicos, p.e. tics, tambaleo, convulsiones, o cualquier alteración inusual.

Firma del propietario: ..... Fecha: .....

Teléfono de contacto: .....