

DIARREA EN GATOS

Las heces de los gatos son marrones y bien formadas. Si sufren diarrea, la consistencia de las heces se vuelve blanda o incluso acuosa, así mismo el color puede cambiar a tonos más claros o más oscuros de lo normal. También podemos encontrar sangre fresca o moco en las heces.

El patrón habitual de defecación también puede cambiar y pueden mostrar esfuerzos al defecar. Estos signos han de tenerse en cuenta ya que ayudarán a determinar la causa de la diarrea.

Causas de la diarrea

La diarrea puede ser causada por numerosas enfermedades, ya sean dentro del tracto gastrointestinal (por ejemplo, las infecciones) como fuera de él (por ejemplo, hígado o riñón). En gatos jóvenes la diarrea, la mayoría de las veces, está causada por:

Dieta: En gatitos lactantes, la sobrealimentación (ya sea por ser alimentados con demasiada frecuencia o por ingerir demasiada leche en cada una de las tomas) es una razón común para el desarrollo de una diarrea explosiva.

Si se cría a mano a un gatito, la utilización de los alimentos que no están diseñados para el gato, o la sobrealimentación son errores comunes que pueden conducir también al desarrollo de diarrea.

Del mismo modo, la falta o disminución de leche de una madre puede causar el subdesarrollo del tracto intestinal, dando lugar a la diarrea.



Heces blandas

Cedida por: Salvador Cervantes (SA Veterinarios, BOV)

Después del destete, cambios repentinos en la dieta puede causar diarrea. Algunos gatitos desarrollan intolerancia a la lactosa (la lactosa es un componente de la leche) y sufrirán de diarrea si se les da leche.

Los Gatitos juguetones pueden comer cosas que no deberían y causarles malestar intestinal.

Causas infecciosas: Virus, bacterias o parásitos (por ejemplo, los gusanos) pueden ser causas de diarrea.

Cuando este es el caso, se suele observar a más de un gatito afectado en una camada o pueden verse afectados otros gatos que convivan en un mismo hogar.

Las infecciones por parvovirus (o panleucopenia), coronavirus y rotavirus son causas virales frecuentes de diarrea.

Salmonella y Campylobacter son dos bacterias que pueden cursar con diarrea.

De los parásitos intestinales tanto los gusanos como los protozoos pueden causar diarrea.

No obstante, la mayoría de gatos jóvenes afectados por estas últimas infecciones suelen mostrar, como síntoma principal, un pobre crecimiento con mayor frecuencia que diarrea.

En los gatos adultos las causas más comunes de diarrea son las siguientes:

- Enfermedad inflamatoria intestinal que muchas veces responde a la dieta
- Intolerancia alimentaria
- Enfermedades infecciosas como la giardiasis
- Tumores
- Enfermedades sistémicas como el hipertiroidismo

Síntomas de diarrea

Los síntomas que presente el gato dependerán en gran medida de la parte del intestino afectada.

Aquellos en los que el problema se deba a alteraciones en el intestino delgado mostrarán grandes volúmenes de diarrea acuosa y pérdida de peso.

Cuando se trata de diarrea de intestino grueso el gato defeca heces blandas de pequeño tamaño en las que en ocasiones se puede observar moco y sangre fresca. Con frecuencia defecan un número de veces mayor del habitual, y presentan un mayor esfuerzo en el momento de defecar.

No obstante, en la mayoría de ocasiones los gatos muestran una combinación de síntomas de intestino delgado y grueso.

Es relativamente fácil monitorizar la consistencia y aspecto de las heces del gato si este es un único gato y usa un arenero. Sin embargo, en los gatos que defecan fuera, o en una casa con varios gatos, puede resultar mucho más difícil determinar lo que está sucediendo.

No obstante, si la diarrea se convierte en grave, incluso los gatos que defecan fuera comienzan a tener accidentes/pérdidas dentro de casa porque no pueden salir a tiempo. También podemos encontrar restos de heces blandas pegadas al pelo bajo la cola. Si sospecha que su gato tiene problemas de diarrea lo mejor sería aislarlo de los demás. El vómito es también un signo común en los gatos que tienen problemas en el tracto gastrointestinal.

Algunos gatos puede empezar a beber un poco más para compensar el líquido perdido por la diarrea.

Test diagnósticos

Su veterinario examinará a su gato y después de hacerle varias preguntas decidirá si son necesarias otras pruebas para confirmar el diagnóstico. Si la diarrea se ha desarrollado recientemente, y el gato está activo y alerta, el veterinario tal vez necesitará tratar únicamente los síntomas, y el problema se podría resolver en breve. Si la diarrea es crónica (dura más de cuatro semanas) o si otros signos clínicos están presentes, se requiere a menudo pruebas de diagnóstico adicionales para encontrar la causa subyacente.

Frecuentemente, es necesario llevar a cabo análisis de sangre y orina para descartar enfermedades fuera del tracto gastrointestinal (como el hipertiroidismo, enfermedad hepática, enfermedad renal) así como para determinar si el gato ha sido infectado con el virus de la leucemia felina o el virus de inmunodeficiencia felina.

Las pruebas de sangre también se utilizan a veces para evaluar la función del intestino y el páncreas.

Puede que le sean solicitadas muestras fecales para examinarlas, determinar la presencia de parásitos tales como gusanos y si es preciso realizar un cultivo para detectar la presencia de bacterias anormales. A menudo es necesario examinar más de una muestra para confirmar o descartar una infección.

En determinados casos son necesarias las radiografías (rayos X) y la ecografía para examinar el tracto gastrointestinal y detectar anomalías.

A veces las biopsias del tracto gastrointestinal son imprescindibles para hacer un diagnóstico. El estómago junto a la primera parte del intestino delgado y el intestino grueso pueden ser examinados mediante un endoscopio y, en caso necesario, es posible tomar diminutas biopsias con unas pinzas especiales que pasan a través del endoscopio. Esto puede proporcionar una alternativa a la toma de biopsias mediante una laparotomía (una operación quirúrgica), aunque no descarta la necesidad en algunos casos de utilizar esta técnica.

Tratamiento

El tratamiento siempre se adaptará a la causa subyacente a tratar (por ejemplo, medicamentos apropiados para eliminar los parásitos u otras infecciones).

Si un gato de repente desarrolla diarrea, pero sin embargo se muestra activo, puede ser suficiente el ayuno durante 24 horas y a menudo la enfermedad es autolimitante. Durante este tiempo al gato se le puede prescribir una solución para rehidratarle (siempre y cuando no tenga vómitos). Después del ayuno, se recomienda una dieta de consistencia blanda, muy digestible y baja en grasa. Esta puede contener pollo o pavo y arroz.

Inicialmente el gato debe ser alimentado en tres o cuatro comidas al día para reducir la posibilidad de sobrecarga de su intestino.

Durante los dos a tres días siguientes, la dieta debe cambiarse de forma gradual a su dieta normal. Si el gato está muy aletargado o deshidratado, será necesario que reciba fluidos intravenosos.

En los casos más graves, o gatos con diarrea de larga duración, serán necesarias más pruebas para determinar la causa y por tanto el tratamiento más apropiado. Los antibióticos sólo son útiles en el tratamiento de la diarrea bacteriana si se ha encontrado un cultivo fecal positivo, o si el intestino se encuentra gravemente dañado.

Generalmente en la mayoría de los casos no son útiles e incluso pueden agravar la diarrea.

La enfermedad inflamatoria intestinal es multifactorial y el tratamiento se prescribe de forma individual. La dieta juega un papel importante en el tratamiento. Las dietas que a menudo son prescritas contienen una única fuente novel de proteína (que es una proteína que el gato no ha comido en los últimos seis meses) y están bien equilibradas. El gato debe alimentarse únicamente con esta dieta durante al menos cuatro semanas para juzgar si hay alguna mejoría. También pueden ser necesarios medicamentos adicionales para controlar la inflamación del intestino.

Si el cáncer es la causa subyacente de la diarrea puede ser tratado bien con cirugía y/o con agentes quimioterápicos. El tratamiento depende del tipo de cáncer y el alcance de la invasión de éste en el intestino.

En algunos casos, la causa de la diarrea no puede llegar a determinarse por tanto se pueden utilizar algunos medicamentos para proporcionar un control sintomático del problema.

Pronóstico

El pronóstico, por supuesto, dependerá de la causa de la diarrea. Aquella que se maneje fácilmente con la dieta y / o medicamentos tendrá un buen pronóstico. En todos los casos, el diagnóstico precoz de la enfermedad evitará que los cambios a largo plazo en el intestino puedan ser irreversibles.



compartiendo información
por el bien del gato
GEMFE es un miembro de FVF

El Feline Advisory Bureau es el organismo sin ánimo de lucro líder en la promoción de la salud y bienestar de los gatos a través de la mejora de nuestros conocimientos de todo aquello que tiene que ver con los felinos, para ayudarnos a cuidar mejor a nuestros gatos. Actualmente ayudamos a casi 4 millones de gatos y a sus dueños cada año. Si esta hoja te ha ayudado a cuidar mejor de tu gato, por favor permítenos ayudar a otros gatos haciendo un donativo. Puedes hacerlo tanto en la web como mandando un cheque a la dirección de abajo (pagable a "Feline Advisory Bureau")

FAB, Taeselbury, High Street, Tisbury, Wiltshire, SP3 6LD, UK
www.fabcats.org

INFORMACIÓN PATROCINADA POR:



vets' no.1 choice™



Diseño y realización: <http://estudicalvet.blogspot.es>